




Informatie van uw tandarts

# Orthodontie





# Orthodontie

Maakt de stand van het gebit optimaal en mooi.



Orthodontische afwijkingen zijn grofweg in te delen in twee categorieën:

1. Afwijkingen die het gevolg zijn van een verkeerde groei van de kaken.
  2. Afwijkingen die te maken hebben met een onregelmatige stand van het gebit.
- Veel mensen hebben een combinatie van beide.

## Het eerste consult

Tijdens het eerste consult wordt besproken wat de reden van uw bezoek is. Soms wordt tijdens het eerste consult al een overzichtsfoto (OPT) gemaakt. Wanneer de behandeling start, zal er een afspraak gemaakt worden voor portretfoto's, röntgenfoto's en afdrukken voor gebitsmodellen.

Door het rechtzetten van de tanden wordt de kans op gaatjes en tandvleesziekten verkleind en de kauwfunctie verbeterd.



### Behandelplan

Omdat iedere mond uniek is, wordt er voor iedere patiënt een individueel behandelplan samengesteld aan de hand van de bevindingen uit de onderzoeken.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke wensen en omstandigheden.

U ontvangt altijd een begroting van de orthodontische behandeling, die gemiddeld tussen de € 2.000,- en € 3.000,- zal liggen.

### Plaatsen beugel

Afhankelijk van de noodzakelijke correctie, zal de behandeling starten met uitneembare apparatuur (ook wel slotjes of brackets genoemd).

Hierbij kunt u denken aan de headgear (buitenboordbeugel) of de activator (blokbeugel), gevolgd door vaste apparatuur (slotjes of sterretjes). Ook kan de correctie alleen met vaste apparatuur behandeld worden. Voor het plaatsen van apparatuur is vaak 45 minuten gepland.



## Controle en verwijdering van beugel

Elke vier tot zes weken zullen er controleafspraken plaatsvinden in de (gemiddelde) behandeltime van twee jaar. Wanneer het gewenste resultaat behaald is, wordt de beugel verwijderd. Achter de tanden kan een roestvrijstalen draadje (spalkje) worden aangebracht, om ervoor te zorgen dat het resultaat stabiel blijft. Mogelijk worden er afdrucken gemaakt voor een nachtbeugel.

Na verwijdering van de beugel zullen er meerdere controles plaatsvinden van de nieuwe gebitssituatie. Wanneer hierna blijkt dat de situatie stabiel is, wordt de orthodontische behandeling afgesloten.

---

**Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Vraag het uw tandarts.**

